

**EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS REFERENTES AOS
GABARITOS DAS PROVAS OBJETIVAS**

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP, através do INEPAM, **DIVULGA** o julgamento dos recursos dos gabaritos das provas objetivas conforme abaixo:

Auxiliar de Farmácia

Questão 21

Um documento do tipo "Planilha do Microsoft Excel" tem a extensão de arquivo .xlsx.
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa "D".

Recepcionista

Questão 21

Um documento do tipo "Planilha do Microsoft Excel" tem a extensão de arquivo .xlsx.
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa "D".

Técnico de Enfermagem

Questão 19

Conforme gabarito oficial divulgado na data de 19 de dezembro de 2022 (<https://inepam.org.br/concurso/downloadAnexo.do?idAnexo=12>) a alternativa correta é a letra "C".

Recurso indeferido.

Questão 25

A alternativa correta é a letra B.

A cisticercose é a infecção causada pelas larvas de *T. solium*.

<https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/cest%C3%B3deos-vermes-em-fita/infec%C3%A7%C3%A3o-por-taenia-solium-t%C3%A7%C3%A3o-da-carne-de-porco-e-cisticercose#:~:text=Cisticercose%20%C3%A9%20infec%C3%A7%C3%A3o%20causada,ovos%20excretados%20nas%20fezes%20humanas.>

Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa "B".

Questão 31

A alternativa correta é a letra E porque houve mudança no protocolo.
houve mudança no protocolo.

SÍFILIS LATENTE

Período em que não se observa nenhum sinal ou sintoma clínico da sífilis. É dividida em sífilis latente recente (menos de dois anos de infecção) e sífilis latente tardia (mais de dois anos de infecção). A duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou terciária.

<https://www.saude.mg.gov.br/sifilis>

Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa “E”.

Questão 33

A alternativa correta é a letra D.

A testagem para IST durante a gestação é importante, pois possibilita o diagnóstico precoce, permitindo agir em tempo adequado para o controle da infecção materna, bem como, para prevenção da transmissão vertical. Assim, é preciso estar atento(a) aos momentos considerados favoráveis para tomada de decisão, conforme a infecção (HIV, sífilis e hepatite B e C), durante o período de gestação e no momento do parto, conforme apresentadas a seguir:

Para o HIV e a sífilis, a testagem deve ser realizada:

- **No pré-natal:** realizar na 1ª consulta (de preferência no 1º trimestre da gestação), e deve também ser realizado no 3º trimestre da gestação.
- **No parto:** independentemente da testagem ter sido realizada no pré-natal.
- Em situações de exposição de risco ou violência sexual.
- Em caso de abortamento.

[https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/transmissao-vertical/prevencao-da-transmissao-](https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/transmissao-vertical/prevencao-da-transmissao-vertical#:~:text=Quando%20a%20gestante%20deve%20realizar,para%20preven%C3%A7%C3%A3o%20da%20transmiss%C3%A3o%20vertical)

[vertical#:~:text=Quando%20a%20gestante%20deve%20realizar,para%20preven%C3%A7%C3%A3o%20da%20transmiss%C3%A3o%20vertical](https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/transmissao-vertical#:~:text=Quando%20a%20gestante%20deve%20realizar,para%20preven%C3%A7%C3%A3o%20da%20transmiss%C3%A3o%20vertical).

Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa “D”.

São Paulo, 04 de janeiro de 2023.

Banca Examinadora do Processo Seletivo nº 01/2022 da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita do Passa Quatro